

主治医各位

平素よりお世話になっております。

貴院かかりつけの _____ 様が、薬局における非インスリン療法中の2型糖尿病に対するFreeStyle リブレと短時間の構造化された糖尿病支援プログラムの臨床的有用性ランダム化比較試験（略称：COMPASS-Libre study）に参加されることとなりました。

この研究は2型糖尿病患者様を対象に、血糖センサーを2週間試用し、2つのグループ（①薬剤師による糖尿病管理支援プログラムを受けていただくグループ②小冊子を利用し糖尿病管理支援プログラムを受けていただくグループ）から、どちらかのグループに無作為に割り当て、3か月間（12週間）糖尿病管理支援を行うものです。

HbA1c やグルコース値に加え、血糖パターンを視覚化して線で動きをみることで、患者様の療養にお役立ていただければと考えます。どうぞ宜しくお願いいたします。

ご不明な点がございましたら、下記薬局担当者までお問合せください。



リブレとは

Flash Glucose Monitoring

皮下の間質液中のグルコース値を1分毎に測定し、**15分毎**に自動的に記録し、**最長14日間**の測定が可能

血液中と間質液中のグルコース濃度の違い

- グルコースは消化管から血液中へ、毛細血管膜を通じて間質液中へ、そして細胞中へと運ばれる



薬局名